



Lepidoptera NYMPHALIDAE
Fabriciana niobe LINNAEUS, 1758



Bayern Oberallgäu
 Allgäuer Alpen Grünten Süd
 1100m 16.06.1976
 leg. Coll. W. Tausend

Präp.Nr.1963

Genitalpräparat
 Nr. 1963



Lateralansicht anatomisch rechts



Dorsalansicht



Aedoeagus oben Lateralansicht
 gedreht bis unten Dorsalansicht

Fabriciana niobe LINNAEUS, 1758

Insgesamt sehr ähnlich *adippe*.

Der kräftige Uncus hat distal eine lange, konische, nach ventral geneigte Form, mit einem kleinen Haken am Ende. Am Tegumen sitzen am ventralen Rand (an der Uncusbasis), zwei kleine Anhänge. Das Tegumen zeigt in Dorsalansicht einen nicht durchgehend chitinisierten Bereich. Die ventrale Valve hat in Lateralansicht eine dreieckähnliche Form und ist dorsal mit einem nach kaudal gerichteten, bezahnten Fortsatz bestückt. Im Gegensatz zu *adippe* ist dieser nach dem Ansatz *nicht nach dorsal aufgebogen*. In Dorsalansicht ist er nach medial gedreht und zeigt anschließend eine schmaler werdende, kurze, gerade Form nach kaudal.

Der Saccus hat in Dorsalansicht eine sehr breite Form. Am Aedoeagus sind die innen liegenden Cornuti sichtbar, nur in separierter Darstellung er ist etwas kürzer als die Valve. Das Phallotrema liegt dorsal symmetrisch.